


Les injectables en Normandie


Etat des lieux

FA PVVIH en Normandie orientale


2316 patients entre 01/01/2021 et 21/09/2023



Quels traitements ARV entre 01/01/2021 et 21/09/2023 ?



Les injectables quand?



Décembre 2021

Avril 2022


Septembre 2023

Commercialisation
Cabotégravir & Rilpivirine
Sous forme injectable
(Vocabria & Rekambis)

1^{ère} prescription
d'injectable en HN

42^{ème} prescription
d'injectable en HN

Historiques thérapeutiques



Découverte du VIH depuis

En médiane (IQR): 2010 (2004 ; 2015)

Délai diagnostic du VIH – Initiation des injectables

En médiane (IQR) : 12,4 ans (7,0 – 18,2)


Min – Max : 0,9 ans – 36 ans

Nombre de lignes de traitement avant initiation injectable

En médiane (IQR) : 4 (2 – 6)



Min – Max : 1– 4

Caractéristiques épidémiologiques



Age

Médiane (IQR)	45,5 (37 ; 56) ans	47 (45; 58) ans	45 (35; 57) ans
MIN - MAX	27 ans – 67 ans	41 ans – 67 ans	27 ans – 64 ans



Réponse aux traitements

CV: 100 % cv indétectable
CD4 médiane (IQR) = 743 (579 ; 1023)

BMI

Médiane (IQR)	25,2 (23,9 ; 27,8)
MIN - MAX	19,1 – 35,1

4 PVVIH : BMI >30