

ACTU SCIENTIFIQUE

Journée des acteurs, jeudi 2 mars 2023

Anaïs LESOURD

Manuel ETIENNE



1^{er} janvier 2023

Le Monde

SOCIÉTÉ • CONTRACEPTION

Les préservatifs gratuits pour les jeunes en pharmacie à partir du 1er janvier

< 26 ans

Préservatifs externes de marques « Eden » et « sortez couverts »

Si Couverture maladie : CPAM ou AME

1 boîte /j

Sans ordonnance

Préservatif

HUFFPOST

Préservatifs gratuits : le succès de la mesure « montre que les jeunes ont envie de se protéger »

En janvier, deux millions de préservatifs ont été distribués gratuitement aux moins de 26 ans. Le dispositif est pour l'instant un succès alors que les IST sont en recrudescence chez les jeunes ces dernières années.



1^{er} janvier 2023

Contraception

Contraception d'urgence

- en pharmacie sans ordonnance
- pour toutes les femmes (mineures et majeures)
- gratuite et sans avance de frais

Lévonorgestrel si <72H

Ulipristal acétate si < 5 jours



Contraception gratuite pour les femmes < 26 ans

« prise en charge intégrale des frais liés à la contraception » :

- prise en charge 100%

- sans avance de frais

 - le coût de la contraception

 - une consultation par an (médecin, sage-femme)


 - les examens biologiques

- différentes contraceptions :

 - pilules hormonales de 1^{ère} ou de 2^{ème} génération*

 - implant contraceptif hormonal

 - dispositif intra-utérin



Contraception orale

<https://www.perinatalite-centre.fr/>



🏠 / [IVG Contraception Santé Sexuelle](#) / [Contraception](#) / Modèles d'ordonnances

Modèles d'ordonnances

Vous trouverez ci-dessous les différents modèles d'ordonnances de contraceptifs et biologie remboursables par l'assurance maladie avec les modalités de facturation, délivrance ou renouvellement en officine ou au laboratoire en fonction des situations suivantes :

- gratuité pour les mineur.e.s avec secret
- gratuité mineur.e.s sans besoin de secret
- gratuité majeur.e.s de moins de 26 ans (ayant une couverture sociale et pas d'anonymisation possible)
- majeur.e.s de plus de 26 ans (pas de gratuité possible)

Mais aussi les modèles d'ordonnances de renouvellement de contraceptifs non remboursables quel que soit l'âge.

Ces modèles sont destinés à faciliter la rédaction de vos ordonnances et à permettre aux usager.e.s une délivrance, des examens biologiques et une facturation en adéquation avec la législation en vigueur.

Vous pouvez copier-coller chacune d'entre elles et les insérer dans vos logiciels pour simplifier votre quotidien (seul le corps de l'ordonnance est copiable)

Identification et coordonnées
de l'établissement



| | |
|--|----------------------------------|
| Identification du prescripteur Identification du prescripteur N°RPPS | NOM Prénom, date de naissance |
|--|----------------------------------|

Chef de service :



Contraceptions hormonales orales prises en charge parmi :

- Ethinylestradiol 20ug/Levonorgestrel 100ug
- Ethinylestradiol 30ug/Levonorgestrel 150ug
- Biphase Ethinylestradiol 30ug//40ug/Levonorgestrel 150//200 ug
- Triphasique Ethinylestradiol 30//40//30ug/Levonorgestrel 50//75//125ug
- Levonorgestrel 30ug
- Desogestrel 75ug

Identification et coordonnées
de l'établissement



| | |
|--|----------------------------------|
| Identification du prescripteur Identification du prescripteur N°RPPS | NOM Prénom, date de naissance |
|--|----------------------------------|

Chef de service :



Demande de secret : Non Oui

A faire sur une ordonnance isolée :

- Dispositif intra-utérin (DIU) cuivre
- Système intra-utérin (SIU) hormonal
- Diaphragme
- Injections IM trimestrielles de Medoxyprogestérone 150mg/3mL (Dépoprova°)
- Implant sous-cutané à l'Etonogestrel (Nexplanon°)

Modalités de délivrance des contraceptifs remboursables aux mineur.e.s sans limite d'âge inférieur en cas de demande de secret :

- NIR anonyme : 2 55 55 55 CCC 042/XX pour la mineure ou 1 55 55 55 CC 042/XX pour le mineur
- Date de naissance exacte de l'utilisateur
- Nature d'assurance maladie 10 (AS/10)
- Code exo 3 : 100% pour les consultations standards (sauf CCP)
- Facture en télétransmission Sesam sans vitale
- Dispense d'Avance de Frais (DAF)
- Sur la feuille de soins, cocher la case « l'assuré n'a pas payé la part obligatoire et n'a pas payé la part complémentaire » dans la zone « paiement »

Dépistage du VIH... et des IST ?

- sur ordonnance : VIH, hépatites, IST
- sans ordonnance, gratuit en laboratoire de ville
 - ✓ VIH
 - ✓ IST (chez les moins de 26 ans ?) en 2023

Les petits + en CeGIDD :

- Confidentialité possible, mineurs, absence de couverture maladie
- Avec +/- counselling, PrEP, vaccination, dépistage et accompagnement violences sexuelles, chemsex ...
- Autres professionnels : psychologues, assistantes sociales, gynécologues, sages-femmes, etc


Papillomavirus humains

Virus à ADN

Transmission sexuelle directe ou indirecte (sex-toys)

Infection de cellules épithéliales kératinisée

Infection résolutive spontanément ≤ 2 ans



Papillomavirus et cancer


Carcinogenic human papillomavirus infection

Mark Schiffman¹, John Doorbar², Nicolas Wentzensen¹, Silvia de Sanjosé³, Carole Fakhry⁴, Bradley J. Monk⁵, Margaret A. Stanley² and Silvia Franceschi⁶

Table 1 | Global estimated number of new cancer cases attributable to HPV in 2012


| Cancer site | New cases (n) | Attributable to HPV (n) | Attributable fraction (%) [*] | Attributable by sex (n) | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | | | Men | Women |
| Cervix uteri | 528,000 | 528,000 | 100 | – | 528,000 |
| Anus | 40,000 | 35,000 | 88 | 17,000 | 18,000 |
| Vagina and vulva | 49,000 | 20,000 | 41 | – | 20,000 |
| Penis | 26,000 | 13,000 | 51 | 13,000 | – |
| Oropharynx | 96,000 | 29,000 | 31 | 24,000 | 6,000 |
| Oral cavity and larynx | 358,000 | 9,000 | 2.4 | 7,000 | 2,000 |
| Total | 1,097,000 | 634,000 | 58 | 61,000 | 574,000 |

Estimates of the number of cancer cases by cancer site, sex and country were calculated from GLOBOCAN 2012 (<http://globocan.iarc.fr/>)




HPV détectés dans les cancers invasifs ano-génitaux

Papillomavirus et cancer anal



Échelle de risque du cancer anal (taux d'incidence pour 100 000 patients-années)




Test HPV-HR
Recherche d'HPV de haut risque oncogène (dont HPV-16)



ALGORITHME DE DEPISTAGE DES FEMMES DE 30 A 65 ANS

Test HPV-HR

Recherche d'HPV de haut risque oncogène (dont HPV-16)



* résultat négatif pour une lésion intra-épithéliale ou maligne

DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS

- **Objectif** : dépasser les 60 % de dépistage actuels en France

Le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus est un nouveau programme de dépistage des cancers, mis en place par les autorités de santé publique en 2018. Ce programme a pour objectifs d'augmenter la couverture du dépistage pour atteindre 80 %, de réduire les inégalités d'accès à ce dépistage et de diminuer de 30 % l'incidence et la mortalité par cancer du col de l'utérus à 10 ans. Santé publique France a pour mission de réaliser l'évaluation épidémiologique des programmes de dépistage des cancers.

- Auto-prélèvement vaginal (APV) : alternative possible pour les femmes > 30 ans non dépistées ou insuffisamment dépistées : test HPV-HR à partir d'APV tout aussi sensible pour détecter les lésions pré-cancéreuses du col qu'à partir du prélèvement réalisé par le clinicien

Il comprend :

- l'envoi d'invitations et de relances en direction des femmes n'ayant pas réalisé de dépistage dans les intervalles de temps recommandés ;
- le suivi de l'ensemble des femmes dont le résultat du test de dépistage réalisé entre 25 et 65 ans est anormal ou positif, qu'elles aient participé spontanément ou qu'elles aient été invitées par courrier à participer au dépistage ;
- la rationalisation des pratiques de dépistage et l'amélioration des pratiques professionnelles (intervalles entre deux tests, suivi des femmes présentant un résultat anormal/positif, etc.) ;
- la mise en place d'actions spécifiques ou de stratégies complémentaires (accompagnement au dépistage, médiation sanitaire, auto-prélèvements, unités mobiles, etc.) en direction de populations vulnérables et/ou très éloignées du système de santé ;
- la diversification de l'offre de prélèvement s'appuyant sur les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes et d'autres professionnels de santé par des actions de formations et d'assurance qualité des prélèvements ainsi que des actions d'information en direction des professionnels et des femmes.

La mise en œuvre opérationnelle du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus est confiée aux centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC).

Prévention vaccinale des infections à Papillomavirus et des cancers...

GARDASIL 9[®]

(11-13 ans) M0 – M6

≥ 14 ans à 19 ans : M0, M2, M6

HSH – rattrapage possible jusqu'à 26 ans inclus

115,84 euros par vaccin

Remboursement CPAM 65% dans l'AMM



Thérapeutique






Emmanuel Macron @Em... · 20 h

Officiel du gouvernement - France

Le papillomavirus, nous pouvons l'éradiquer.

Dès la rentrée prochaine, la vaccination sera proposée au collège pour les 800 000 élèves de 5ème. Et l'accès au vaccin sera facilité pour tous les jeunes, sans reste à charge.

PreP « longue durée d'action »...

| INTRAVAGINAL RING (IVR) | IMPLANT | INJECTABLE | ANTIBODY |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Polymer ring inserted into the vagina releases antiretroviral drug over time. | Device implanted in the body releases antiretroviral drug over time. | Long-acting antiretroviral drug is injected into the body. | Antibody is infused or injected into the body. |

NIH National Institute of Allergy and Infectious Diseases: Long-Acting Forms of HIV Prevention

Pas encore d'autorisation de mise sur le marché en France
Recommandé par OMS (juillet 2022)
Disponible aux USA
(décembre 2021)

FDA NEWS RELEASE
FDA Approves First Injectable Treatment for HIV Pre-Exposure Prevention

Drug Given Every Two Months Rather Than Daily Pill is Important Tool in Effort to End the HIV Epidemic

Thérapeutique

WHO recommends long-acting cabotegravir for HIV prevention



New WHO guidelines advise countries to deliver long-acting cabotegravir as part of comprehensive approach to HIV prevention

28 July 2022 | News release | Reading time: 3 min (830 words)



GUIDELINES ON
**LONG-ACTING
INJECTABLE
CABOTEGRAVIR FOR
HIV PREVENTION**

PreP « longue durée d'action »...

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| |  |  |
| <p>Active Products</p> | <p>Long-acting injectable cabotegravir (CAB LA), oral cabotegravir (CAB), oral FTC/TDF</p>  | <p>Long-acting injectable cabotegravir (CAB LA), oral cabotegravir (CAB), oral FTC/TDF</p>  |
| <p>Populations</p> | <p>4,570 cisgender men and transgender women who have sex with men</p>  | <p>3,200 (projected) cisgender women</p>  |
| <p>Locations</p> | <p>Argentina, Brazil, Peru, South Africa, Thailand, U.S., Vietnam</p>  | <p>Botswana, Eswatini, Kenya, Malawi, South Africa, Uganda, Zimbabwe</p>  |
| <p>Start Date</p> | <p>December 2016</p>  | <p>November 2017</p>  |
| <p>Study Design</p> | <p>Non-Inferiority of CAB LA to FTC/TDF A non-inferiority study tests whether one drug works about the same as, but not worse than, another drug</p> | <p>Superiority of CAB LA to FTC/TDF A superiority study tests whether one drug works better than another drug</p> |
| <p>Study Steps</p> | <p>STEP 1 5 weeks of 2 daily oral pills – 1 active and 1 placebo</p> <p>STEP 2 Injections every 8 weeks and daily pills for up to 3 years</p> <p>STEP 3 Daily oral pills for 48 weeks</p>  | <p>STEP 1 5 weeks of 2 daily oral pills – 1 active and 1 placebo</p> <p>STEP 2 Injections every 8 weeks and daily pills for up to 3 years</p> <p>STEP 3 Daily oral pills for 48 weeks</p>  |
| <p>Study Results</p> | <p>The study showed superiority of CAB LA over oral FTC/TDF, meaning CAB LA worked better to prevent HIV infection in the population than oral FTC/TDF.</p> <p>There was a 66% reduction in HIV infections in study participants provided CAB compared to FTC/TDF.</p> | <p>The study showed superiority of CAB LA over oral FTC/TDF, meaning CAB LA worked better to prevent HIV infection in the population than oral FTC/TDF.</p> <p>There was a 89% reduction in HIV infections in study participants provided CAB compared to FTC/TDF.</p> |

■ = placebo

Jamieson, L. *Lancet Hiv* 9, e857–e867 (2022)

Delany-Moretlwe, S. *Lancet* 399, 1779–1789 (2022)



PreP « longue durée d'action »...



PrEP with LA Injectable Cabotegravir Highly Effective for Women



38 HIV infections in 3223 women, median age 26 years
Botswana, Eswatini, Kenya, Malawi, Uganda, Zimbabwe



CI, confidence interval




PreP « longue durée d'action »...




Adherence to Pill and Injections



TFV Plasma Concentrations



Cabotegravir Injections Coverage



- Both products safe and well tolerated
- No discontinuation due to injection site reaction
- Similar pregnancy outcomes



PreP « longue durée d'action »...



PrEP with LA Injectable Cabotegravir Highly Effective for MSM and TGW



52 HIV infections in 6389 PY of follow-up
1.4 (IQR 0.8-1.9) years median per-participant follow-up





CI, confidence interval

Landovitz RJ



LA Cabotegravir Remains Highly Effective in the Open Label Phase (1y)

42 incident HIV infections in 2865 PY of follow-up
10.4 months median per-participant follow-up



CI, confidence interval


PreP « longue durée d'action »...

Points de vigilance...

- initiation : séroconversion VIH entre dernier test et début PrEP
- maintenance : IM /2 mois +/- 7j
- arrêt : séroconversion VIH dans les 2 mois qui suivent arrêt
- obésité, etc...

et bien sûr... autres IST, €, etc..

Formation des CeGIDD par le COREVIH ?



When stopping Apretude®

Confirmed negative HIV-1 RNA assay
Syphilis, gonorrhea, & chlamydia testing (MSM/TGW only)



Discuss ongoing prevention strategies*

PreP « longue durée d'action »...

Notre défi : l'accès aux soins → prioriser ?




Pas de Prep en Cegidd ?

Plénière Corevih Normandie
31/01/2023

by **AIDES**
Membre de la Coalition internationale


© Niphon Subari - 123RF




Inégalités d'accès aux soins en Normandie

Plénière COREVIH Normandie
31/01/2023

Manon Pruvost-Couvreur



Prévention Post Exposition: Chlamydia/syphilis/ gonocoque

DOXYPEP (USA):

- Doxycycline en post exposition (<72H) après rapport sexuel à risque :
- réduction de 65% de *Chlamydiae* et Syphilis
- réduction < 30% de gonocoque
- légère augmentation de la résistance de staphylocoque doré


Non recommandé en France



Evalué pour HSH,
une évaluation négative chez les femmes


Peu efficace sur gonocoque !

Thérapeutique



Prévention Post Exposition: Chlamydia/syphilis/gonocoque


Essai ANRS DOXY VAC (cohorte PREVENIR)




Doxycycline

90% efficacité sur Chlamydia

40-50% efficacité sur gonocoque




Gonocoque :
84 patients infectés
40 dans le bras pas de PEP
 (incidence : 41,3/100 PA),
44 dans le bras Doxy PEP
 (incidence : 20,5/100 PA)



Prévention Post Exposition: Chlamydia/syphilis/gonocoque


Essai ANRS DOXY VAC (cohorte PREVENIR)



Vaccin

50% efficacité sur gonocoque

urétrite ??



| Site PCR + | Vaccin 4C Men B (n = 257) | | Pas de vaccin (n = 245) | | IRR (IC ₉₅) | p |
|-----------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| | Nb d'évts (IR pour 100 PA) | Nb pts | Nb d'évts (IR pour 100 PA) | Nb pts | | |
| Anus seulement | 14 (7,8) | 14 | 21 (11,8) | 19 | 0,66 (0,31-1,36) | 0,23 |
| Gorge seulement | 8 (4,5) | 7 | 17 (9,6) | 16 | 0,47 (0,17-1,14) | 0,073 |
| Anus+gorge | 7 (3,9) | 7 | 11 (6,2) | 10 | 0,63 (0,21-1,78) | 0,35 |
| Urine | 7 (3,9) | 6 | 5 (2,8) | 5 | 1,39 (0,38-5,55) | 0,59 |

Prévention COMBINÉE !!

Traitement de l'infection à gonocoque

Update on French recommendations for the treatment of uncomplicated *Neisseria gonorrhoeae* infections

In order to address the urgency of providing FSS with guidance, pending a formal update on French recommendations (in process)¹⁵ and considering national resistance figures, the NRC, the SPILF and the SFD jointly recommend that uncomplicated anogenital NG infections be treated with CRO, 1000 mg as a single dose, effective even on isolates with an MIC to CRO between 0.125 and 0.5 mg/L.¹⁶ Regarding oropharyngeal infection, which is asymptomatic in at least 90% of cases and for which efficacy of most antibiotics is hampered by suboptimal pharyngeal diffusion, one should, whenever possible, tailor therapy to the resistance profile of NG isolates involved and refer to the algorithm in [Figure 1](#). If impossible, CRO 1000 mg monotherapy remains the appropriate probabilistic choice with emphasis on a mandatory test of cure 2 weeks after treatment completion. In patients returning from Asia Pacific where the prevalence of CRO resistance is high¹⁷ a dual CRO 1000 mg + AZM 2000 mg regimen will be preferred.

INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS

International Journal of STD & AIDS
2021, Vol. 32(11) 1081–1083
© The Author(s) 2021
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/09564624211023025
journals.sagepub.com/home/std
SAGE

Thérapeutique

Recommandations traitement IST à
gonocoque
(*Neisseria gonorrhoeae*)


CEFTRIAZONE IM 500 mg
→
CEFTRIAZONE IM 1 g

Reco britanniques BASHH (2019) : Ceftriaxone 1 g
Reco européennes Unemo et al. (2020) : Cetriaxone 1 g
Reco américaine CDC (2020) : Ceftriaxone 1 g si > 150 kg


NB : Traitement IST à Chlamydiae
DOXYCYCLINE 100 mg x 2/jour 7 jours

Eradiquer l'hépatite C ?

Accompagnement




Source : Global Burden of Disease



Parcours simplifié hépatite C

Accompagnement

Journée du réseau hépatites Normandie
Juin 2022



traitement par EPCLUSA® ou MARAVIRET®

ALD 30, prise en charge 100%

EPCLUSA® 1 cp/jour - 10 semaines

MAVIRET® 3 cp/jour en 1 prise avec un repas - 8 semaines


CV VHC en fin de traitement
et 12 semaines après la fin de traitement

Si CV VHC négative = guérison !

95% de cas de guérison

Bonne tolérance clinique et biologique

KYSS - Know Your Status



Application de notification aux partenaires

Quizz pour les usagers



OOOPS! C'est anonyme et gratuit

D'après tes réponses, tu t'exposes à des infections sexuellement transmissibles (IST) et tu pourrais être porteur.se d'IST, même sans avoir de symptômes.

CONSEILS

La PrEP[®] est un moyen qui pourrait te protéger.

Tu peux trouver une consultation PrEP[®] (gratuite dans un CeGIDD) près de chez toi.

Trouver une consultation PrEP

Tu peux trouver une consultation CeGIDD (gratuit) près de chez toi.

Trouver un CeGIDD



#SEXPLOITED



#SEXPLOITED

www.sexexploited.org



Application mobile d'aide et d'accompagnement (français)

Mobile app for assistance and support (anglais)

Aplicación móvil de asistencia y soporte (espagnol)

Aplicação móvel para assistência e suporte (portugais)

Мобильное приложение для получения помощи и поддержки (russe)

تطبيق المحمول من المساعدة والمرافقة (arabe)

Мобилно приложение на помощ и съпровод (bulgare)

Aplicație mobilă de ajutor și însoțire (roumain)

移动应用程序的帮助和伴奏 (chinois)

Мобільний додаток для допомоги та підтримки (ukrainien)



#SEXPLOITED

Une application mobile multilingue pour faciliter la protection, l'accompagnement et la reconstruction des personnes en situation de prostitution, permettant une mise en contact directe avec des structures spécialisées grâce à la géolocalisation.



10 LANGUES

(français, anglais, espagnol, chinois, arabe, bulgare, roumain, russe, portugais, ukrainien)



400 STRUCTURES SPÉCIALISÉES



37.000 BÉNÉFICIAIRES DIRECT-E-S



8 NUMÉROS D'URGENCE



1 ESPACE DÉDIÉ AUX DROITS



AUCUNE COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES

#8 CHAMPS D'INTERVENTION



AIDE ET ÉCOUTE
271 résultats



AIDE JURIDIQUE
(dont aide aux personnes migrantes)
263 résultats



ACCOMPAGNEMENT À L'INSERTION PROFESSIONNELLE
124 résultats



AIDE ALIMENTAIRE
103 résultats



AIDE À L'HÉBERGEMENT
139 résultats



PREVENTION SANTE
92 résultats



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
179 résultats



URGENCES MEDICALES
598 résultats



DrNaked

PARIS & SEINE-SAINT-DENIS SANS SIDA

DrNaked

UN CANAL DE COMMUNICATION CONÇU POUR LES JEUNES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS LGBTQI+

Flo Fortuné, Elodie Ana, direction@parissanssida.fr

287 publications 21.8k followers 2,763 suivie(s)

Dr Naked
L'éducation sexuelle que t'as pas eue à l'école
VIH, IST, fiertés, dépistage
By l'asso Vers Paris sans sida
Ressources
www.parissanssida.fr/ressources

Dans un contexte où les imaginaires hétéro-centrés, marqués par la violence des LGBTphobies, sont dominants. Les jeunes LGBTQI+ peuvent interpréter les messages généraux de santé comme ne leur étant pas destinés.

Vers Paris Sans Sida a créé un canal qui s'insère dans un univers de communication propre à la communauté LGBTQI+ et répond à ses besoins singuliers.

Le compte instagram @drnaked c'est aujourd'hui :

- plus de 21 000 abonné-e-s,
- le principal compte de prévention, de RDRD et d'éducation à la vie affective et sexuelle à destination des jeunes LGBTQI+ en France.

Il s'inscrit en complémentarité de Sexosafe - dispositif de Santé publique France dont le cœur de cible est les HSH entre 30 et 50 ans.

LES MESSAGES DE PRÉVENTION : S'ADAPTER AUX PRÉOCCUPATIONS ET BESOINS DES JEUNES LGBTQI+

Construit autour de la **curiosité**, du **plaisir** et du **désir** éloigné de la notion de risque, le discours @drnaked s'inscrit dans un moment de la vie où se construisent les sexualités et les comportements de prévention.

- Il ne se focalise pas principalement sur les risques infectieux liés à la sexualité mais se développe à partir des préoccupations concrètes et des besoins globaux des personnes dans les différentes dimensions de leur vie sexuelle et affective.
- Les posts sont élaborés en interagissant en permanence avec les abonné-e-s et les associations communautaires. Ils privilégient des messages positifs, tenant compte des contextes de réception propres aux personnes concernées et visant à favoriser leur adhésion, dans une perspective d'empowerment.
- Les posts présentent un univers graphique en phase avec les codes culturels de la cible.

ORIENTATION VERS DES RESSOURCES ADAPTÉES : PASSER DE L'INTENTION À L'ACTION.

- Renvoi systématique vers des ressources digitales et territoriales à Paris et en Seine-Saint-Denis.
- Les structures d'orientation sont communautaires ou LGBTQI+ friendly (accueil inclusif et pratiques adaptées).

MÉTHODE : UNE DIFFUSION PAR ET POUR LA COMMUNAUTÉ

- Promotion du dispositif lors d'événements communautaires LGBTQI+.
- Stratégie de chat d'espace publicitaire (sponsoring) ultra-ciblée, via Instagram, en direction d'un public LGBTQI+ de 18 à 25 ans.
- Des partenariats avec des influenceur-euse-s communautaires et des comptes suivis en majorité par des jeunes entre 18 et 30 ans.
- Gagner en visibilité via des partenariats et des concours avec des marques populaires auprès de la cible.

Safe Sex

N'ont peut aussi sonner comme :

- On se sent plus sûr
- On se sent plus libre
- On se sent plus en confiance

UNE PERSONNE SEROPOSITIVÉ QUI PREND SON TRAITEMENT

Vie toujours avec le VIH mais reste en bonne santé. Ne transmet pas le VIH à ses partenaires.

Hey ! T'as pensé à la PrEP ?

Comment ça fonctionne ?

Tu as du mal à dormir ? Tu ne te sens pas bien ? Tu te sens seule ?

BON PLAN

La prise de test rend-elle stérile ?

MESURE D'AUDIENCE : UN COMPTE REPÈRE POUR LES JEUNES HSH

L'audience est composée de 74% d'abonné-e-s entre 18 et 34 ans.

Les indicateurs de mesure du réseau social mettent en avant une répartition avec 70% d'abonnés hommes et 30% d'abonnées femmes. Le compte dispose d'une visibilité importante auprès des HSH autour de 35 ans - âge médian d'infection à VIH.

Les messages privés reçus donnent des indications :

- Une interaction plus importante des HSH avec le contenu (questions les plus courantes : PrEP et HPV chez les hommes).
- Une part importante de HSH multipartenaires.

UNE CIBLE INVISIBLE : LES HSH MIGRANTS

Le compte reçoit régulièrement des messages privés de personnes qui ne s'abonnent pas au compte. Il s'agit majoritairement de jeunes HSH migrants. Cela rend compte d'une consommation média spécifique. Une interaction et la fréquentation de contenus sans abonnement, qui peut être synonyme de potentiel outing.

@drnaked développe de nouvelles stratégies pour s'adresser à ce public HSH migrants mais également aux TDS, via par exemple des partenariats avec le projet Jasmine (TDS), le relais des posts de BadBoyz et du STRASS, mais aussi la co-création de contenus avec des comptes influents auprès des HSH migrants comme QueensOfNorthAfrica.

GILEAD



drnaked Suivre Contacter

280 publications 21,7 k followers 2 776 suivi(e)s

Dr Naked
L'éducation sexuelle que t'as pas eue à l'école
VIH, IST, fiertés, dépistage
By l'asso Vers Paris sans sida
Ressources
www.parissanssida.fr/ressources



Qu'est ce qui se passe quand on a un résultat vih positif ?

Prise en charge Traitements Ressources

@DrNaked

CORQVIH
NORMANDIE